

Cerisier tardif

Cerisier d'automne; Cerisier noir

Black Cherry

**Feuilles :**lancéolées, denticulées et pointues ;
5 à 12 cm de longueur*Été* : vert foncé, luisantes*Automne* : jaune orangé ou rouges

Écorce

**Fleurs :**longues grappes pendantes ;
10 à 15 cm de longueur*Couleur* : blanches*Saison* : printemps*Odeur* : légèrement parfumées**Fruits :**drupes ; 8 mm de diamètre ;
persistant jusqu'en octobre*Couleur* : rouges, puis noirs*Saison* : automne*Utilisation animale* : oiseaux**Remarques :**rustique, indigène du Québec ; légèrement
sensible à la pollution urbaine ; bois recherché
en ébénisterie**Espacement requis :****10 m****Famille** : Rosacées**Forme** : grand arbre**Zone de rusticité** : 2 b**Croissance** : moyenne**Exposition** : soleil**Hauteur** : 20 m**Largeur** : 10 m**Valeur ornementale** : élevée**Aspect** : port conique, puis ovoïde et irrégulier ;
rameaux retombants ; écorce presque noire chez les
vieux individus, odorante et s'exfoliant**Disponibilité** : faible**Usages** : isolé, massif et naturalisation ; approprié
dans les grands espaces**Sol** :*Humidité* : moyenne*Texture* : loameuse*pH* : neutre*Compaction* : faible tolérance*Sel de déglacement* : tolérance*Sol* : sols profonds, riches et humides**Enracinement** : enracinement profond ; planter des sujets
produits en motte ou en pot pour une meilleure reprise**Taille** : taille après la floraison au besoin**Maladies** : légère sensibilité : nodule noir**Insectes** : peu de problèmes entomologiques